

Chaldée persane, Kélaten (alt., 200 mètres), J. de Morgan, 1904  
2 exemplaires.

Nous sommes très heureux de dédier cette variété à M. J. de Morgan, l'Archéologue distingué qui a si puissamment contribué à faire connaître la civilisation élamite.

---

*SCRAPTIA NOUVEAUX D'AFRIQUE*

[Col. Hétéromères].

PAR M. PIC, CORRESPONDANT DU MUSÉUM.

---

***Scraptia abyssinica* nov. sp.**

Satis elongatus, subparallelus, modice nitidus, griseo-pubescens, testaceus, oculis nigris; thorace densissime punctato, ad basin mediocri biimpresso.

Assez allongé, presque parallèle, médiocrement brillant, pubescent de gris, testacé avec les yeux noirs, élytres un peu rembrunis par places. Tête courte et large, faiblement impressionnée entre les yeux, fortement et irrégulièrement ponctuée, suture frontale distincte. Antennes testacées sur les trois premiers articles, rembrunies sur les suivants, celles-ci un peu épaissies; prothorax court, presque en demi-cercle antérieurement, densément ponctué, orné sur la base, une de chaque côté, de deux impressions médiocres, un peu allongées, avec une trace de sillon transversal entre celles-ci; écusson grand, subtronqué au sommet, fortement ponctué; élytres un peu plus larges que le prothorax, longs, faiblement rétrécis postérieurement, fortement et assez densément ponctués, parsemés de quelques petits points. Longueur: 6 millimètres.

Abyssinie (Raffray). Collections du Muséum de Paris.

Le type de cette espèce paraît être un ♂; je lui attribue dubitativement, et provisoirement comme ♀, un deuxième exemplaire de la même origine, de forme élytrale un peu plus élargie et moins longue.

Voisin de *nigrolimbata* Pic, distinct à première vue par l'absence de bande foncée sur les côtés des élytres.

***Scraptia impressa* nov. sp.**

Modice elongatus, subconvexus, nitidus, griseo-pubescens, rufo-brunneus, oculis nigris; thorace sparse punctato, distincte et quadri-impresso.

Modérément allongé, un peu convexe, brillant, pubescent de gris, roux brunâtre avec les yeux noirs. Tête assez courte et relativement large, fortement et peu densément ponctuée, plus finement et densément devant la suture frontale très distincte. Antennes grêles, foncées sur leur milieu,

testacées à l'extrémité et roussâtres à la base; prothorax très court et large, presque en demi-cercle, à ponctuation forte et orné de quatre impressions, une médiane, trois basales, celle du milieu subarrondie, les latérales allongées; écusson assez grand, subarqué au sommet, finement et éparcement ponctué; élytres<sup>(1)</sup> un peu plus larges que le prothorax, longs, subparallèles, courtement rétrécis et subarrondis séparément au sommet; dessous du corps un peu rembruni. Longueur : 8 millimètres.

Congo français : Ogooné N'Kogo (J. Bouysson). Collections du Muséum de Paris.

Peut se placer près de *Pouillon* Pic; il est plus convexe, avec le prothorax plus fortement ponctué et différemment impressionné.

---

*ANTHOCORIDE NOUVEAU DU DAHOMÉY.*

**Hémiptères,**

PAR M. LE D<sup>r</sup> G. HORVATH.

Le Muséum d'Histoire naturelle de Paris a reçu de M. Auguste Chevalier deux petits Hémiptères qu'il a recueillis aux environs de Ouidah, au Dahomey. Ces Insectes sembleraient jouer un certain rôle dans la fécondation de l'*Elæis guineensis* Jacq.

Le premier coup d'œil m'a permis de reconnaître qu'ils appartiennent aux Anthocorides, c'est-à-dire à une famille dont les espèces ne sont jamais phytophages, mais toujours carnassières, se nourrissant d'autres petits Arthropodes, comme les Aphidiens, Collemboles, Acariens, etc. Il est donc probable que ces Anthocorides vont se mettre en chasse dans les épis mâles et femelles de l'*Elæis*, parce qu'ils y trouvent, attirés par le parfum des inflorescences du palmier, des proies abondantes et d'un abord aisé.

Un des Anthocorides est le *Piezotethus afer* Reut., répandu en Afrique. On le connaît de la Tunisie, de l'Égypte, de l'Érythrée, de l'Afrique orientale et du Damara.

L'autre représente une espèce restée inconnue jusqu'ici. J'en définis ci-dessous les caractères distinctifs.

***Lyctororis longirostris* nov. sp.**

Breviter ovalis, niger, nitidulus; capite latitudine sua cum oculis paullo brevior, sublævi, apice lateribusque pone oculos ferrugineis; an-

(1) Je possède, originaire du Gabon, un exemplaire que je distingue du type comme variété sous le nom de *V. nigronotata*, ayant les impressions prothoraciques un peu moins larges et chaque élytre orné de deux macules noires allongées, l'antérieure surtout, une humérale, l'autre en dessous du milieu.